




کد TE\_PA\_125

## آنژیوگرافی رادیال



بیمارستان پارسیان شهرکرد  
038-3150  
شهرکرد-جاده دانشگاه آزاد-منظریه  
Parsianhospital-shk.ir  
info@parsianhospital-shk.ir

### عوارض آنژیوگرافی:

این روش عموماً بی خطر می باشد اما می تواند به ندرت

سبب:

\* خونمردگی و خونریزی در ناحیه مچ دست

\* نارسایی کلیه

\* ایجاد واکنش حساسیتی

\* درد قفسه سینه و بی نظمی ضربان قلب شود.

خونریزی مثل وجود خون در ادرار و مدفوع، کبودی جدید پرستار را مطلع سازید.

۴- بعد از گذشت یک ساعت از انجام آنژیوگرافی قادر به پیاده روی در بخش می باشد.

۵- بعد از گذشت ۴-۶ ساعت مچ بند باز شده و یک پانسمان فشاری روی محل کانولاسیون شریانی بکار برده می شود.

۶- برای مدت ۴۸ ساعت بعد از آنژیوگرافی از خم کردن مچ دست و بلند کردن اشیاء سنگین اجتناب کنید .

۷- باید به بیمار توصیه کرد که پس از استراحت طولانی، در اولین مرتبه خروج از بستر، از دیگران کمک بگیرد زیرا امکان کاهش فشار خون وضعیتی وجود دارد  
۸- ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از مرخص شدن شما می توانید پانسمان را برداشته و دوش بگیرید..

باتشکر از توجه شما




۷- زیور آلات و دندان مصنوعی جهت آنژیوگرافی خارج شود.

### مراقبت‌های حین آنژیوگرافی

۱- روز آنژیوگرافی لباس مخصوص آنژیوگرافی می پوشید و به شما یک سرم تزریق می شود و زمانی که نوبت شما فرا رسید با کمک پرسنل به واحد آنژیوگرافی منتقل می شوید از شما نوار قلبی گرفته می شود و روی تخت مخصوص آنژیوگرافی می خوابید سپس ناحیه مچ دست ضدعفونی شده و جهت آنژیوگرافی آماده می شوید.

۲- در طول انجام آزمایش بیدار خواهید بود و در اتاق آنژیوگرافی لوله ای داخل رگ شما گذاشته شده که ممکن است کمی احساس فشار در محل ورود لوله داشته باشید در پایان کار از دست شما خارج می گردد که چند دقیقه ای باید آن ناحیه را فشار داد تا خونریزی آن متوقف شود سپس مچ بند روی محل بسته می شود.



۳- همکاری شما در انجام آنژیوگرافی موثر می باشد بنابراین طبق نظر پزشک سرفه کنید یا نفس عمیق بکشید سرفه کردن ممکن است باعث قطع نامنظمی ضربان قلب گردد و به عبور ماده حاجب از شرایین کمک نماید و تنفس عمیق و طولانی

آنژیوگرافی یک اقدام تشخیصی است که به منظور مشخص شدن وضعیت رگهای قلب از نظر تنگی و یا گرفتگی آنها انجام می گیرد.

در این روش بعد از بررسی وضعیت شریانی با تست آلن از طریق شریانی در مچ دست وارد سیستم شریانی شده و آنژیوگرافی انجام می شود.



### مراقبت های قبل از آنژیوگرافی:

۱- بیمار بایستی ۸ الی ۱۲ ساعت قبل از آنژیوگرافی ناشتا باشد.

۲- داروهای قلبی خود را مطابق معمول میل کنید.

۳- داروهای ضد انعقادی مانند وارفارین را از ۴ روز قبل از آنژیوگرافی قطع کنید.


۴- در صورت مبتلا بودن به بیماری قند خون، از خوردن داروی پایین آورنده قند خودداری نمایید و در صورت تزریق انسولین حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

۵- در صورتی که نارسایی کلیه دارید و یا دیالیز می شوید حتماً پزشک را مطلع سازید.

۶- روز قبل از آنژیوگرافی به حمام رفته و موهای دست ها به ویژه دست راست را به طور کامل بتراشید.

کمک می کند که دیافراگم پایین تر رفته و ساختمان قلب بهتر دیده شود.

۴- تزریق ماده حاجب منجر به حس گرما در تمام بدن و احساس نیاز به دفع ادرار می شود که در عرض یک دقیقه و یا کمتر بر طرف خواهد شد.



### مراقبت های بعد از آنژیوگرافی:

۱- بیمار باید ۲-۴ ساعت بعد عمل ناشتا باشد سپس تشویق به دریافت مایعات شود

۲- باید دست را برای مدت زمان ۶-۴ ساعت بعد از پروسیجر بصورت مستقیم نگه داشت.

۳- در صورت وقوع هر گونه درد قفسه سینه، رنگ پریدگی، سردی، نبض ضعیف، تغییر در حس و